

لیست خوراکی های خطرناک برای سگ ها

• مرجع سریع برای سرپرستان سگ



 بسیار پرخطر — اورژانس فوری، حتی بدون علامت

خوراکی	مکانیسم / دلیل خطر	اقدام حیاتی
شکلات (تیره / پخت)	تنویرومین که سگ به کندی متابولیزه می کند.	تماس فوری با دامپزشک: علائم تا ۶-۱۲ ساعت دیرتر ظاهر می شوند. صبر نکنید.
انگور و کشمش	مکانیسم ناشناخته؛ آسیب کلیوی غیرقابل پیش بینی	حتی یک دانه را جدی بگیرید. تماس فوری صرف نظر از نژاد یا اندازه ی سگ
زایلیتول (آدامس، خمیردندان، برخی کره بادام زمینی ها)	افت شدید انسولین + احتمال نارسایی کبدی بدون هشدار اولیه	همان لحظه تماس بگیرید؛ نرمال بودن ظاهری تضمینی نیست!
پیاز، سیر، تره	تخریب گلبول های قرمز و کم خونی همولیتیک، در تمام اشکال (خام، پخته، پودری) سمی است.	توجه: علائم می توانند تا ۵ روز بعد ظاهر شوند.

 خطرناک — نیاز به توجه جدی

خوراکی	مکانیسم / دلیل خطر	اقدام حیاتی
آجیل ماکادامیا	مکانیسم ناشناخته؛ اثر عصبی-عضلانی	ضعف پاها را ظرف ۱۲ ساعت را جدی بگیرید
خمیر نان خام (مخمردار)	تولید گاز و الکل در معده	خطر نفخ / پیچش معده؛ هرگز خمیر در حال ور آمدن در دسترس نگذارید

استخوان پخته	خطر پارگی یا انسداد دستگاه گوارش	هرگز استخوان پخته ندهید؛ فقط خام و زیر نظر
هسته	حاوی ترکیبات سیانیدی	میوه را همیشه هسته گیری شده بدهید.
الکل	مسمومیت با دوز پایین تر از انسان	هرگز حتی مقدار کم در دسترس نگذارید
 احتیاط — خطر کمتر، اما باید مراقب بود		
خوراکی	مکانیسم / دلیل خطر	اقدام حیاتی
نمک زیاد	دهیدراتاسیون و ناراحتی گوارشی در مقادیر بالا	تشنج‌ها شور (چیپس، پفک) را ندهید
لبنیات و شیر	عدم تحمل لاکتوز در اکثر سگ‌ها	اسهال یا نفخ = علامت قطع مصرف
آووکادو	خطر پایین در سگ (برخلاف پرنده و برخی گونه‌ها)	مقدار کم معمولاً بی خطر، اما هسته را دور نگه دارید
قانون طلایی: اگر سگتان هر کدام از موارد دسته قرمز را خورد، حتی بدون علامت، حتماً همان لحظه با دامپزشک تماس بگیرید		
منبع: ASPCA Animal Poison Control Vetinoo.ir		